

DESARROLLO TÉCNICO
ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS

TIPO DE AGROINSUMO: Fungicida agrícola			
NOMBRE COMERCIAL: FLONEX® Z 400			
FORMULACION: Suspensión acuosa	pH DE LA FORMULACIÓN: 5 a 6	COLOR: Café claro	SOLUBILIDAD EN AGUA: Miscible
COMPOSICION PORCENTUAL:			PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA FORMULACIÓN:
Ingrediente activo Zineb Etilen bis ditiocarbamato de zinc 33.0 (Equivalente a 400 g de i.a./kg)			Zineb
Ingredientes inertes Disolvente (agua), dispersantes, humectantes y compuestos relacionados..... 67.0 Total: 100.0			FAMILIA QUÍMICA: Ditiocarbámico FORMULA QUÍMICA: $C_4H_6N_2S_4Zn$
MODO DE ACCIÓN: FLONEX® Z 400 debe aplicarse a la aparición de los primeros síntomas de las enfermedades. Se aplica por aspersión, con una presión de 20 a 40 libras/pulgada cuadrada.			

CATEGORÍA DE PELIGRO: 5 Precaución	RESIDUALIDAD: Moderadamente	NÚMERO DE REGISTRO: RSCO-FUNG-0346-318-008-033
--	---------------------------------------	--

USOS AUTORIZADOS:

Cultivos	Enfermedades	Dosis Litros/ha	Recomendaciones
Tabaco (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum spp</i>) Mancha foliar (<i>Alternaria spp</i>) Moho azul (<i>Peronospora tabacina</i>) Ojo de rana (<i>Cercospora nicotianae</i>)	3	Debe aplicarse a los primeros síntomas de la enfermedad repitiendo el tratamiento a intervalos de 5 a 7 días mientras prevalezcan condiciones de clima propicio para el desarrollo de los patógenos.
Ornamentales (SL)	Mancha foliar (<i>Mycosphaerella spp</i>) Roya (<i>Uromyces caryophyllinus</i>) Tizón foliar (<i>Alternaria dianthi</i>)	25 a 50 ml en 10 Litros de agua/ha.	

(SL) Intervalo de seguridad Sin Límite.

Tiempo de reentrada: 24 horas después de la aplicación del producto.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS: Lea detenidamente la etiqueta del producto y siga las indicaciones de uso.	PRESENTACIONES COMERCIALES: Envase de 1 L Cubeta de 18 L	RESPONSABLE DEL PRODUCTO: Arysta LifeScience México, S.A. de C.V. Blvd. Jesús Valdés Sánchez No.2369 Col. Europa, C.P. 25290. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México. Tel. 01 844 438 05 00
---	---	---